

Recomendaciones para padres sobre traumatismo craneal (Golpes en la cabeza en niños)

Dr. Jorge Sancho Z.

www.kidsdoctorcostarica.com



Sí su hijo (a) ha sufrido un traumatismo craneal de carácter leve. Ha sido valorado por personal médico, no habiendo encontrado ningún hallazgo preocupante en el momento actual. A pesar de ello, usted debe realizar una vigilancia domiciliaria estrecha (incluso despertándole durante la noche un par de veces) en las siguientes 24 horas.

Es normal que el niño (a) continúe un poco asustado (a), que no recuerde el momento del golpe, que tenga algún vómito esporádico o que se queje de cefalea (dolor de cabeza) difusa, leve o en la zona del traumatismo en las próximas horas.

ALERTA

Pero, si usted detecta alguno de los siguientes signos, favor acudir de nuevo con su hijo (a) al servicio de urgencias para una revaloración

- Cefalea (dolor de cabeza) o irritabilidad intensas y persistentes.
- Vómitos continuos 8 horas después del traumatismo.
- Salida de sangre o de un líquido claro por los orificios nasales o por los oídos.
- Si está desorientado, confuso, no conoce a los familiares próximos, no sabe dónde está... (cuando corresponda por edad).
- Alteración del equilibrio (si corresponde para la edad de su hijo), de la forma de andar, de la visión o de la forma de hablar, etc.
- Movimientos extraños, incapacidad para moverse o pérdida de fuerza de manos o piernas.
- Pupilas (punto negro de los ojos) de diferente tamaño.